

Алгоритм назначения препарата Фавипиравир для лечения пациентов в амбулаторных условиях

1. Показанием к назначению препарата является наличие у пациента подтвержденной методом ПЦР коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Среднетяжелое течение заболевания:
 - Лихорадка выше 38 С
 - ЧДД более 22 в минуту.
 - Одышка при физических нагрузках.
 - Изменения КТ, рентгенографии ОГК типичные для вирусного поражения минимальные или средние. КТ 1-2.
 - SpO2 менее 94 %.
 - СРБ сыворотки крови менее 10мг/мл.
3. Срок начала терапии 1-3 день от момента появления клинических симптомов (не позднее 5-7 дня).
4. Возраст пациента старше 18 лет. С осторожностью у пациентов старше 65 лет.
5. Перед началом лечения необходимо информировать пациента о возможных рисках и побочных эффектах препарата с оформлением информированного согласия.
6. Оформить информированное согласие пациента.

Противопоказания и ограничения к применению

1. Повышенная чувствительность к препарату.
2. Беременность (тератогенный эффект, гибель эмбриона на ранней стадии).
3. Во время планирования беременности мужчинам и женщинам (сохраняется в сперме до трех месяцев).
4. Почечная недостаточность.
5. Печеночная недостаточность (острый или хронический вирусный гепатит в стадии обострения).
6. При назначении препарата кормящим женщинам необходимо прекратить грудное вскармливание на время приема и в течение 7 дней после его окончания.
7. Подагра, гиперурикемия.

Схема назначения препарата Фавипиравир:

- Пациенты с массой менее 75 кг: по 1600 мг (8 табл.) 2 р/сут. в 1-й день и далее по 600 мг (3 табл.) 2 р/сут. в 2-10-й дни. На курс лечения 70 табл.
- Пациенты с массой тела 75 кг и более: по 1800 (9 табл.) мг 2 раза/сут. в 1-й день, далее по 800 мг (4 табл.) 2 раза/сут. со 2 по 10 день. На курс лечения 90 табл.