Отзыв

на автореферат диссертации Полянского Максима Борисовича «Применение Ронколейкина при мукоклазии желчного пузыря в эксперименте и у пациентов старшей возрастной группы (экспериментально-клиническое исследование)», представленной к защите в диссертационный совет Д 208.039.02 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

В настоящее время отмечается отчетливая динамика увеличения продолжительности жизни населения, что ведет к росту заболеваемости ЖКБ и связанным с ней острым холециститом у лиц пожилого и старческого возраста. Проблема лечения острого холецистита у больных с высоким операционно-анестезиологическим риском не утратила своей актуальности после внедрения и широкого распространения чрескожных вмешательств под УЗ-контролем. Одним из способов преобразования первично дренирующего вмешательства при остром холецистите в радикальное является облитерация полости желчного пузыря. В связи с этим достойной альтернативой «открытой» или лапароскопической холецистэктомии у пациентов с высоким операционно-анестезиологическим риском считается мукоклазия желчного пузыря

Избранный автором способ термической мукоклазии при помощи латексного баллона является безопасным, щадящим для пациента, а последующий контроль демукотизации позволяет сразу же оценить эффективность проведенного сеанса мукоклазии.

А.П. Парахонский, А. А. Ярилин, М. А. Пальцев указывают на то, что с возрастом наблюдается закономерное снижение реактивности организма. Процессы регенерации тканей напрямую связаны с иммунной системой. Одним из наиболее эффективных иммуностимуляторов отечественного производства является препарат «Ронколейкин».

В своей диссертационной работе Полянский Максим Борисович изучает данный препарат не только с иммунологической стороны, но и как стимулятор роста и развития соединительной ткани в патологическом очаге, в частности воспаленном желчном пузыре после проведения термической мукоклазии его полости.

Цель исследования сформулирована четко, задачи, поставленные исследователем, полностью решены.

Обзор литературы полностью отражает современные подходы к лечению острого холецистита у пациентов с высокой степенью операционно-анестезиологического риска, а так же приведены убедительные литературные данные эффективности клинического применения препарата «Ронколейкин».

В главе «Материалы и методы» подробно изложены методы экспериментального и клинического исследования. Четко выделены все этапы исследования. Методы исследования, использованные автором, современны, информативны и позволяют решить поставленные в ходе диссертационной работы задачи.

Экспериментальное исследование выполнено на достаточном количестве животных (31 кролик породы «шиншилла»). В ходе экспериментального исследования все животные были разделены на группы и подгруппы в соответствии со сроками выведения из эксперимента, а также применения препарата «Ронколейкин». Для доказательства эффективности использования препарата «Ронколейкин» было выполнено гематологическое и морфологическое исследование. Анализ полученных результатов подвергался тщательной компьютерной обработке.

Клиническое исследование выполнено на 130 больных острым холециститом. Все больные были разделены, в соответствии с целями и задачами исследования, на несколько направлений, а так же групп и подгрупп. В главе подробно описано изменение динамики иммунного статуса наблюдаемых пациентов в зависимости от применения препарата «Ронколейкин». Установлены некоторые возрастные особенности реактивности при остром холецистите, а также дана оценка морфологическим изменениям в стенке желчного пузыря у пациентов различных возрастных групп. Разработанная шкала оценки тяжести состояния больных острым холециститом с высокой степеньюоперационно-анестезиологического рискапозволяет определиться с методом дренирующей желчный пузырь операции.

В ходе диссертационного исследования установлено, что при термической мукоклазии желчного пузыря у пациентов пожилого и старческого возраста рекомендовано применение препарата «Ронколейкин» в дозировке 500 000 МЕ на 1-е и 3-е сутки послеоперационного периода для коррекции иммунного статуса и стимуляции роста и развития соединительной ткани в стенке желчного пузыря для более быстрой облитерации его полости.

Заключение и выводы, представленные в ходе работы, вытекают из цели и задач исследования. Рекомендации целесообразны. Основные положения, выносимые на защиту, отражают актуальность проблемы.Научная новизна не вызывает сомнений, подтверждается тем, что в ходе исследования получено положительное решение по заявке на патент РФ.

Таким образом диссертационная работа Полянского Максима Борисовича «Применение Ронколейкина при мукоклазии желчного пузыря в эксперименте и у пациентов старшей возрастной группы (экспериментально-клиническое исследование)», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченным научным трудом,

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.0213 года №842, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

Профессор кафедры хирургических болезней
Медицинского института ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет»
Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор А.З. Гусейнов

300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 92;
Тел.: +7 (920) 276-11-11
e-mail: gus_ar@bk.ru

Подпись д.м.н., профессора А.З.Гусейнова заверяю:

Начальник УАК
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» М.В.Метелищенкова

300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 92
тел. (4872) 25-70-98

«16» 04 2018