

Образец заполнения дневника прохождения практики
«Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» 5 курс лечебный факультет

Дата посещения	ФИО пациента, дата рождения	Домашний адрес, место работы, профессия	Жалобы, физикальный статус (при первичном обращении), Диагноз по клинической классификации	План обследования	План лечения	Заполнение документации
06.07.18 На приеме первично	Нестерова И.А., 17.03.1948	ул. Заводская 29/42, пенсионер	Головные боли, головокружение Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное. В легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются, ЧД=18 /мин. Границы сердца расширены влево. Тоны сердца: I ослаблен, акцент II тона над аортой, АД – 170 и 80 мм рт ст.; ЧСС=Ps=56/мин. Язык чистый, влажный, живот мягкий б/болез во всех отделах, с-м поколачивания отриц с обеих сторон. Д-з: АГ II стадии II степ., риск 3. Н ИФК	Общий анализ крови и мочи. Биохим исследование крови на общий холестерин, ЛПВП, ТГ, креатинин, ЭКГ в покое, Эхо-КГ - исследования суточное мониторирование АД,	Режим домашний Диета №10 Валсартан 40 мг/сут Амлодипин по 5 мг 1 раз в сут	Талон амбулаторного пациента, запись в амбулаторной карте, карте диспансерного наблюдения. Направление на лабораторные, ЭКГ и Эхо-КГ - исследования Рецепты на ЛС
06.07.18 На приеме повторно	Иванов А.В. 12.04.1965	ул. Ленина 20/54, водитель ПАТП-2	Язвенная болезнь 12-перстной кишки, фаза обострения	ФГДС повторно после завершения курса лечения	Продолжение лечения Диета №1 Омепразол по 1 капсул. (20 мг) 2 раза в сут. 15 дней	Продление листка нетрудоспособности на 5 дней; направление на консультацию физиотерапевта

					Амоксициллин по 250 мг (1 таб.) 4 раза в сут. 7 дней	
10.07.18 На дому	Попов Н.П. 14.10.1946	ул. Союзная 10/54, пенсионер	ИБС. стенокардия напряжения II ФК АГ II степени III стадии, риск 4, Н IIА. ФК III	Общий анализ крови и мочи. Биохим исследование крови на общий холестерин, ЛПНП, ТГ, К, Na, Са ЭКГ в покое, суточное мони- торирование ЭКГ, консультация кардиолога.	Режим домашний Диета №10 Изосорбида моонитрат по 20 мг (1 таб.) перед физической нагрузкой. Периндоприл по 10 мг 1 раз в сут Бисопролол по 5 мг 1 раз в сут	Запись в амбулаторной карте, карте диспансерного наблюдения. Направление на лабораторные и ЭКГ - исследования Рецепты на ЛС